

# Milpro kleine hond/pup



Samenstelling	Bevat per tablet 2,5 mg milbemycine oxime en 25 mg praziquantel								
Eigenschappen	Milbemycine oxime behoort tot de groep van de macrocyclische lactonen. Het is actief tegen mijten, tegen larvale en volwassen stadia van nematoden als ook tegen de larven van <i>Dirofilaria immitis</i> . Milbemycine oxime vergroot de membraanpermeabiliteit voor chloride ionen via de glutamaat afhankelijke chlorideion-kanalen. Praziquantel is een geacetyleerd pyrazine-isoquinoline derivaat. Praziquantel is actief tegen cestoden en trematoden. Het wijzigt de permeabiliteit voor calcium (toevoer van Ca <sup>2+</sup> ) van de membranen van de parasiet wat een onbalans veroorzaakt in de membraan structuur.								
Doeldier	Hond								
Indicaties	Behandeling van menginfecties van volwassen cestoden (lintwormen) en nematoden (rondwormen) van de volgende soorten: Cestoden: <i>Dipylidium caninum</i> , <i>Taenia spp.</i> , <i>Echinococcus spp.</i> , <i>Mesocestoides spp.</i> Nematoden: <i>Ancylostoma caninum</i> , <i>Toxocara canis</i> , <i>Trichuris vulpis</i> , <i>Crenosoma vulpis</i> (vermindering van het infectieniveau), <i>Angiostrongylus vasorum</i> (vermindering van het infectieniveau door immature volwassenen ( L5) en volwassen stadia). Milpro kan ook worden ingezet bij de preventie van hartwormziekte ( <i>Dirofilaria immitis</i> ) wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden nodig is.								
Toediening/dosering	Voor orale gebruik. Minimum aanbevolen dosering: 0,5 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht éénmalig toedienen. De tabletten toedienen met of na wat eten. Milpro tabletten hebben een vleesmaak en zijn makkelijk toe te dienen (meestal worden de tabletten vrijwillig opgenomen door honden; zelfs zonder voer). Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de hond, is de dosering als volgt: <table border="1" data-bbox="624 1198 1043 1323"> <thead> <tr> <th>Gewicht</th> <th>Aantal tabletten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>½ – 1 kg</td> <td>½ tablet</td> </tr> <tr> <td>&gt;1 – 5 kg</td> <td>1 tablet</td> </tr> <tr> <td>&gt;5 – 10 kg</td> <td>2 tabletten</td> </tr> </tbody> </table> <p>In die gevallen waarbij preventie tegen hartwormziekte wordt toegepast en waarbij gelijktijdige behandeling tegen lintworm vereist is, kan het diergeneesmiddel het monovalent product vervangen voor de preventie van hartwormziekte. Voor de behandeling van <i>Angiostrongylus vasorum</i>-infecties, milbemycine oxime 4 maal toedienen met een interval van een week.</p>	Gewicht	Aantal tabletten	½ – 1 kg	½ tablet	>1 – 5 kg	1 tablet	>5 – 10 kg	2 tabletten
Gewicht	Aantal tabletten								
½ – 1 kg	½ tablet								
>1 – 5 kg	1 tablet								
>5 – 10 kg	2 tabletten								
Contra-indicaties	Niet toedienen aan pups jonger dan 2 weken en/of honden die minder dan ½ kg wegen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of van de hulpstoffen.								
Bijwerkingen	In zeer zeldzame gevallen zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken, diarree, verlies van eetlust en kwijlen) waargenomen.								
Waarschuwingen	Om een effectief wormcontrole programma te ontwikkelen dienen lokale epidemiologische informatie en leefomstandigheden van de hond meegenomen te worden. Studies met milbemycine oxime laten zien dat de veiligheidsmarge bij sommige honden, zoals collies of aanverwante hondenrassen, minder is dan bij andere rassen. Bij deze honden moet de aanbevolen dosering strikt worden gevolgd. De tolerantie van het diergeneesmiddel bij jonge pups van deze rassen is niet onderzocht. De behandeling van honden met een groot aantal circulerende microfilariae kan soms leiden tot het ontstaan van hypersensitieve reacties, zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of overdadig speekselen.								

# Milpro kleine hond/pup

## vervolg

### Vervolg waarschuwingen

Deze reacties worden geassocieerd met het vrijkomen van eiwitten van dode of stervende microfilariae en zijn niet direct een toxisch effect van het product. Het gebruik bij honden die lijden aan microfilariaemie is daarom niet aanbevolen. In gebieden met een hartwormrisico, of in het geval dat het bekend is dat de hond heeft gereisd van en naar regio's met een hartwormrisico wordt aanbevolen om de aanwezigheid van een gelijktijdige besmetting met *Dirofilaria immitis* uit te sluiten.

Er zijn geen studies verricht met zwaar verzwakte honden of individuen met een ernstige vermindering van de nier- of leverfunctie. In een andere studie is aangetoond dat de combinatie van werkzame bestanddelen zeer goed wordt getolereerd door fokteven, ook tijdens dracht en lactatie. Het gelijktijdig gebruik van praziquantel/milbemycine oxime met selamectine wordt goed verdragen. Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van de macrocyclische lactoon selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de aanbevolen dosering van de diergeneesmiddelcombinatie. Door de afwezigheid van verdere studies wordt aanbevolen voorzichtig te zijn bij het gelijktijdig toedienen van het diergeneesmiddel met andere macrocyclische lactonen. Dergelijke studies zijn ook niet uitgevoerd bij fokdieren.

Na toediening handen wassen. In het geval van een accidentele inname, speciaal bij kinderen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de verpakking en/of bijsluiter te worden getoond.

### Voorzorgen

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

### Bewaarcondities/ Houdbaarheid

Bewaren bij kamertemperatuur. Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Bewaar de blister in het doosje. Halve tabletten in de originele verpakking bewaren en gebruiken voor de eerstvolgende toediening. Houdbaarheid na eerste opening van de blister (halve tabletten): 6 maanden.

### Verpakking

Doos met 12 blisters à 2 tabletten

### Registratienummer

REG NL 113685

### Kanalisatie

Vrij

### Artikelnummer

90.013.37

### EAN code

8714076006867