



anibidiol[®] dogs & cats

VOEDINGSSUPPLEMENT VOOR HONDEN EN KATTEN BEVAT HENNEPOLIE (CBD)

■ NAAM EN ADRES DISTRIBUTEUR

Virbac Nederland bv – Hermesweg 15 - 3771 ND Barneveld

■ EIGENSCHAPPEN

Anibidiol is een voedingssupplement voor honden en katten dat cannabidiol (CBD) uit hennepextract bevat. Anibidiol bevat ook vitamine B6 (pyridoxine) en B3 (niacine) om het zenuwstelsel te ondersteunen en vermoeidheid te verminderen. Overige bestanddelen zijn omega-3, omega-6 en omega-9 vetzuren, terpenen en flavonoïden.

■ WERKZAAM BESTANDDEEL EN OVERIGE BESTANDELEN

| Een sachet Anibidiol [®] Regular bevat: | Een sachet Anibidiol [®] Plus bevat |
|--|--|
| • 12 mg hennepolie (2,5 mg CBD) | • 38 mg hennepolie (8 mg CBD) |
| • 16 mg vitamine B3 (niacine) | • 16 mg vitamine B3 (niacine) |
| • 2,5 mg vitamine B6 (pyridoxine) | • 2,5 mg vitamine B6 (pyridoxine) |

Een verpakking Anibidiol bevat 30 sachets van 5 gram.

■ RICHTLIJN TOEPASSING ANIBIDIOL

Dierenartsen in Zwitserland hebben goede ervaringen met het gebruik van: Anibidiol Regular voor ondersteuning van gedragsproblemen, pijn, ontsteking, epilepsie en de gevolgen van tumoren bij katten en kleine honden. Ook bij gedragsproblemen van honden >10 kg kan Anibidiol Regular helpen. Anibidiol Plus bij een grotere CBD behoefte, zoals bij pijn, ontsteking, epilepsie en bij pijn of slechte eetlust als gevolg van tumoren, bij honden >10 kg.

■ DOSERING EN GEBRUIK

| Gewicht | Anibidiol Regular (2.5 mg) 2.5 mg CBD per sachet | Anibidiol Plus (8 mg) 8 mg CBD per sachet; bij een hogere CBD-behoefte |
|--------------|---|--|
| Tot 10 kg | ½ sachet | ½ sachet |
| 10 tot 20 kg | 1 sachet | 1 sachet |
| Vanaf 20 kg | 2 sachets | 2 sachets |

- Meng Anibidiol 1 maal daags direct door het voer. Bij droogvoer is het handig om Anibidiol eerst in een klein beetje water op te lossen en vervolgens door de brokken te mengen. Start met een lage dosis, volgens bijgaand schema.
- Het kan tot een week duren voordat de eerste effecten merkbaar zijn. Daarom moet de dosis, indien nodig, niet binnen 1 week verhoogd worden.
- Ieder dier heeft een individueel metabolisme waardoor de reactie op cannabinoïden in snelheid verschilt. Dienovereenkomstig moet de dagelijkse dosis na de eerste week individueel worden afgestemd op de behoeften van ieder dier.
- De totale dosis wordt één keer per dag worden toegediend, bij voorkeur 's morgens. Ook bij een hogere dosis moet de totale hoeveelheid in één keer worden toegediend.
- Anibidiol dient ten minste 5 weken te worden gegeven om te kunnen evalueren of het het beoogde positieve effect heeft.