

HET GOEDE NIEUWS!


LEISHMANIASIS NIEUWS/ NEDERLANDSE UITGAVE

Er is nu een uniek vaccin tegen deze gevaarlijke ziekte!

Wetenschappers hebben het eerste vaccin tegen leishmaniasis in Europa ontwikkeld. Het eerste vaccin tegen canine leishmaniasis in Europa is het resultaat van baanbrekend onderzoek en een 20-jarige samenwerking van verschillende wetenschappers. Het vaccin zorgt voor een veilige en effectieve reductie van het risico op het ontwikkelen van klinische symptomen. Het lang verwachte vaccin is nu ook beschikbaar bij uw dierenarts.



Waar kunt u de ziekte leishmaniasis tegenkomen?



- Zeer besmet gebied
- Besmet gebied
- Zone met uitbreiding van de besmetting
- Mogelijke uitbreiding van besmetting door aanwezigheid van de drager van de besmetting (zandvlieg)
- Landen waarin op zichzelf staande ziektegevallen zijn beschreven (niet-besmet gebied)
- Geïmporteerde ziektegevallen

Slecht gedocumenteerde situaties:

- 🔍 Op zichzelf staande gevallen?
- 🔍 Besmet gebied?
- 🔍 Geïmporteerde gevallen*

* De grenzen van de gebieden worden niet exact aangegeven
* Bourdeau EMOP 2004; Worldleish4 2009; ECVD 2009; RESFIZ 2009

99.900.35 02/2013 - 13026 Vormgeving: www.ifcommunicatie.nl

www.virbac.nl


Virbac
ANIMAL HEALTH

Virbac Nederland B.V. Postbus 313, 3770 AH Bameveld. E-mail: info@virbac.nl

BELANGRIJK VACCINATIE NIEUWS!

LEISHMANIASIS NIEUWS/ NEDERLANDSE UITGAVE

Is uw hond beschermd? Nieuw vaccin tegen canine leishmaniasis.



Virbac
ANIMAL HEALTH

BELANGRIJK VACCINATIE NIEUWS!

LEISHMANIASIS NIEUWS/ NEDERLANDSE UITGAVE

Canine leishmaniasis; een gevaarlijke ziekte

Leishmaniasis bij de hond wordt veroorzaakt door een parasiet, de *Leishmania infantum*. Deze parasiet kan van hond op hond worden overgebracht door de zandvlieg, die vaak niet herkend wordt en wordt aangezien voor een mug.

De ziekte is een belangrijke zoönose, dat wil zeggen dat een geïnfecteerde zandvlieg de ziekte ook kan overbrengen op de mens. De ziekte leishmaniasis leidt bij de hond niet altijd tot symptomen. Als de hond wel ziek wordt, kunnen de symptomen erg uiteenlopen. Zo kan er bijvoorbeeld koorts ontstaan, kaalheid (met name rond de ogen), gewichtsverlies, huidproblemen en nagelproblemen. Ook inwendige organen kunnen met de parasiet besmet worden wat kan leiden tot bloedarmoede, gewrichtsproblemen en zelfs nierfalen.

De parasiet is erg moeilijk te bestrijden, waardoor behandeling vaak levenslang is. In Europa alleen al zijn ongeveer 2,5 miljoen honden besmet met deze parasiet.



Het eerste vaccin tegen canine leishmaniasis

Er is nu een vaccin dat de bescherming van uw hond naar een nieuw niveau brengt. Naast de toediening van een antiparasiticum tegen de zandvlieg, kunt u nu uw hond laten vaccineren tegen leishmaniasis! Als uw hond voor het eerst tegen leishmaniasis gevaccineerd wordt, krijgt deze drie injecties met een interval van drie weken. Bescherming kan dan verwacht worden vanaf vier weken na de laatste injectie. Daarna is een jaarlijkse herhaling voldoende om de gewenste immunerespons te handhaven.

Preventie is de beste bescherming!

Veel honden in Zuid-Europa lopen een permanent risico op het oplopen van canine leishmaniasis; een ziekte die nu oprukt naar het noorden. Door uw hond te laten vaccineren, reduceert u het risico dat uw hond de ziekte oploopt, omdat het immuunsysteem erop voorbereid wordt de parasiet te doden. Als u de combinatie gebruikt van een antiparasiticum tegen de zandvlieg en de vaccinatie, biedt u uw hond de best mogelijke bescherming!

Vraag uw dierenarts om advies!



Veel gestelde vragen

• Loopt mijn hond gevaar?

De zandvlieg komt op veel plaatsen in Zuid-Europa voor. Op de kaart op de achterzijde kunt u zien in welke gebieden uw hond de ziekte zou kunnen oplopen vanwege de aanwezigheid van de zandvlieg.

• Wat kan ik doen voor mijn hond?

Om contact van uw hond met zandvliegen zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk voor de hond geregistreerde antiparasitica te (blijven) gebruiken. Verder is gebleken dat de zandvlieg vooral actief is tussen 20.00 uur 's avonds en 5.00 uur 's ochtends. Honden binnenhouden gedurende deze periode zal ook het contact met zandvliegen verminderen. Ondanks veelvuldig gebruik van antiparasitica tegen zandvliegen zijn deze nog steeds niet uitgeroeid in Europa.

• Kunnen alle honden gevaccineerd worden?

Vaccinatie kan plaatsvinden bij gezonde honden vanaf een leeftijd van zes maanden. Als uw hond ooit al in een gebied is geweest waar de ziekte voorkomt, is het verstandig om de hond eerst te laten testen op eventuele aanwezigheid van de parasiet.

• Ik ga volgend jaar niet op reis met de hond; is hervaccinatie na twee jaar ook goed?

Zoals voor de meeste vaccins geldt, heeft het immuunsysteem regelmatig een 'boost' nodig om de juiste immunerespons te behouden op een niveau dat genoeg bescherming biedt. Daarom is het belangrijk de hond jaarlijks te hervaccineren.

• Wanneer kan ik het best mijn hond laten vaccineren?

Er is geen speciaal seizoen om uw hond te laten vaccineren tegen leishmaniasis. Omdat de hond de eerste keer drie vaccinaties nodig heeft en de bescherming ongeveer vier weken na de laatste vaccinatie effectief is, is het belangrijk dat u uw hond op tijd laat vaccineren. In dit geval minstens tien weken voor vertrek.