

Canigen Puppy 2b



Samenstelling	1 ml bevat levend geattenuëerd canine parvovirus 2b stam CPV39 met een minimum van 105,6 tot 107,5 TCID ₅₀ * * Tissue culture infectious dose
Eigenschappen	Het werkzame bestanddeel van het vaccin is een geattenuëerd levend canine parvovirus type 2b stam dat de actieve immunisatie stimuleert tegen de enterale vorm van parvovirose bij puppies vanaf 5 weken oud. Het induceert de ontwikkeling van specifieke antilichamen tegen CPV serotypen –2b, -2a, -2.
Doeldier	Hond
Indicaties	Voor de actieve immunisatie van honden vanaf 5 weken oud tegen canine parvovirose, om de virale uitscheiding te reduceren en om mortaliteit en typische symptomen (enterale vorm) te voorkomen. De bescherming begint twee weken na de inenting. Het is aangetoond dat de bescherming aanhoudt totdat de hond 11 weken oud is.
Toediening/dosering	Een dosering van 1 ml subcutaan toedienen aan puppies van 5 weken oud. Vanwege de heterogene distributie van maternale antilichamen bij puppies, wordt aanbevolen 2 weken later opnieuw 1 ml toe te dienen. Voor een langdurende bescherming, dient het dier ingeënt te worden met een parvovirus valentie volgens een gebruikelijk inentingsschema dat dient te beginnen voor de leeftijd van 11 weken.
Contra-indicaties	Geen
Bijwerkingen	Een lichte, kortdurende, soms pijnlijke, pruritus (die minder dan 1 minuut duurt) kan binnen 30 minuten na de vaccinatie voorkomen op de injectieplaats. Ook kan een lichte, kortdurende zwelling ontstaan op de injectieplaats die binnen 2-3 uur spontaan weer verdwijnt. Af en toe kunnen er bij sommige dieren hypersensitiviteitsreacties waargenomen worden. In het geval van anafylactische reacties moet er onmiddellijk gestart worden met een corticosteroïdentherapie of antihistaminica gecombineerd met de gebruikelijke behandeling bij anafylactische reacties/shocks.
Waarschuwingen	Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie. Er zijn geen gegevens beschikbaar betreffende de veiligheid en efficiëntie bij het gelijktijdig gebruik van dit product en andere vaccins. Om deze reden dient men niet gelijktijdig een ander vaccin toe te dienen gedurende 14 dagen voorafgaand en volgend op de vaccinatie met dit product. De vaccinstam kan zich verspreiden. Het is aangetoond dat deze verspreiding geen bijwerkingen veroorzaakte bij drachtige of lacterende teven.
Voorzorgen	Het werkzame bestanddeel is niet pathogeen voor de mens, doch de normale voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen om contact met de huid, met het slijmvlies en zelfinjectie te voorkomen. Raadpleeg bij zelfinjectie onmiddellijk een arts en toon hem/haar de bijsluiter of de verpakking.
Bewaarcondities/Houdbaarheid	Gekoeld bewaren en vervoeren bij een temperatuur tussen 2°C en 8°C. Niet invriezen. Beschermen tegen licht. Houdbaar tot 3 jaar na productiedatum.
Verpakking	Doos met 10 flacons à 1 ml
Registratienummer	REG NL 10265



Canigen Puppy 2b

vervolg

Kanalisatie	UDD
Artikelnummer	90.022.24



Virbac
ANIMAL HEALTH