

Easotic



Samenstelling	Bevat per ml 1,11 mg hydrocortisonaceponaat, 15,1 mg miconazol (als nitraat) en 1505 IU gentamicine (als sulfaat).
Eigenschappen	Easotic bevat een combinatie van drie werkzame bestanddelen (corticosteroïd, antimycoticum en antibioticum). Hydrocortisonaceponaat is een glucocorticosteroïd behorende tot de klasse van diësters met een potente intrinsieke werking. Dit betekent dat het zowel de infectie als de jeuk vermindert, wat leidt tot een snelle verbetering van de klinische symptomen die bij een otitis externa worden waargenomen. Miconazolnitraat is een synthetisch derivaat van imidazol met een sterke antimycotische werking. Miconazol remt op selectieve wijze de synthese van ergosterol, wat een essentieel onderdeel is van het membraan van gisten en schimmels inclusief Malassezia pachydermatis. Gentamicinesulfaat is een aminoglycoside bactericide antibioticum dat de eiwitsynthese inhibeert. Het werkingspectrum omvat Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën, zoals de volgende pathogene organismen, geïsoleerd uit hondenoren: Staphylococcus intermedius, Streptococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Escherichia coli.
Doeldier	Hond
Indicaties	Behandeling van acute otitis externa en acute verergering van recidiverende otitis externa veroorzaakt door gentamicine-gevoelige bacteriën en door miconazol-gevoelige schimmels, met name Malassezia pachydermatis.
Toediening/dosering	Het verdient aanbeveling vóór de behandeling de gehoorgang te reinigen en te drogen en overtollig haar rond de oren weg te knippen. Vóór de eerste toediening de fles goed schudden en op de pomp drukken tot de zelf in de atraumatische canule verschijnt. De aanbevolen dosering is 1 ml per besmet oor, éénmaal per dag gedurende 5 opeenvolgende dagen. Breng de atraumatische canule aan in de gehoorgang. Dien één dosering toe (1 ml) in elk aangetast oor. De juiste dosering wordt verkregen door één enkele pompslag. Dankzij de luchtledige pomp kan het product worden toegediend ongeacht de positie van de fles. Na toediening kan de oorbasis even licht gemasseerd worden zodat het product in het lagere deel van de gehoorgang doordringt.
Contra-indicaties	Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen, voor corticosteroïden, voor andere azole antimycotica en voor andere aminoglycosiden. Niet gebruiken in geval van trommelvliesperforatie. Niet gelijktijdig gebruiken met stoffen waarvan bekend is dat ze ototoxiciteit veroorzaken. Niet gebruiken bij honden met gegeneraliseerde demodicose.
Bijwerkingen	Lichte tot matige roodheid van het oor kan voorkomen, evenals Papulae. Behandeling hoeft hiervoor niet stopgezet te worden, dit geneest vanzelf zonder enige specifieke therapie. Het gebruik van oorpreparaten kan gepaard gaan met gehoortoornissen, meestal is dit tijdelijk, en vooral bij oudere honden. Indien dit voorkomt, dient de behandeling te worden stopgezet.
Waarschuwingen	De veiligheid van Easotic is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Aangezien de systemische absorptie van hydrocortisonaceponaat, gentamicinesulfaat en miconazolnitraat verwaarloosbaar is, is het onwaarschijnlijk dat teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten zullen optreden bij toediening van de voorgeschreven dosering bij honden. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts. Bacteriële en mycotische otitiden zijn vaak secundair. Daarom dient door uitgebreid onderzoek te worden bepaald wat de primaire oorzaak is.

Easotic

vervolg

Voorzorgen

In geval van overgevoeligheid voor één van de componenten moet de behandeling worden stopgezet en dient met een aangepaste therapie te worden begonnen. Het gebruik van het diergeneesmiddel dient gebaseerd te zijn op de identificatie van de causale agentia en op een gevoeligheidsbepaling en er moet rekening worden gehouden met het officiële en lokale antimicrobiële beleid. Indien het gebruik van Easotic afwijkt van de aanbevolen dosering, kan dit leiden tot een toename van resistente bacteriën en schimmels tegen respectievelijk gentamicine en miconazol en tot een afname van de werkzaamheid van de behandeling met aminoglycosiden en azole antimycotica, vanwege het risico op kruisresistentie. In het geval van parasitaire otitis, dient een geschikte antiparasitaire behandeling te worden toegepast. Vóór het toedienen, dient eerst de uitwendige gehoorgang grondig te worden onderzocht om er zeker van te zijn dat het trommelvlies niet geperforeerd is, om zodoende het risico te vermijden dat de infectie zich uitbreidt naar het middenoor en om schade te voorkomen aan de cochlea en het vestibulum. Het is bekend dat gentamicine ototoxisch is, indien het systemisch in een hogere dosering wordt toegediend. Vermijd oog- en huidcontact. In geval van contact, grondig spoelen met water. In geval van oogirritatie, raadpleeg een arts. In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem/haar de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Bewaarcondities/Houdbaarheid

Bewaren in de originele verpakking. Houdbaar tot 1,5 jaar na productiedatum. Na eerste opening van de flacon: 10 dagen.

Verpakking

Flacon à 10 ml

Registratienummer

EU/2/08/085/001 / REG NL 101862

Kanalisatie

UDA

Artikelnummer

90.005.01

EAN code

8714076004733