



ANTI-LEISHMANIOSIS

# Milteforan<sup>®</sup> 20 mg/ml

## Orale oplossing voor honden

### Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

#### ■ SAMENSTELLING

Bevat per ml:

Werkzame stof: miltefosine 20 mg

Excipients: hydroxypropylcellulose, propyleenglycol en gezuiverd water

#### ■ INDICATIES

Leishmaniosis bij de hond.

De klinische symptomen van de ziekte verminderen direct na aanvang van de therapie en zijn na 2 weken significant verminderd. Deze verbetering zet nog door tot tenminste 4 weken na stopzetten van de behandeling.

#### ■ CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor de werkzame stof of een van de excipients.

Niet gebruiken tijdens dracht, lactatie of bij fokdieren.

#### ■ BIJWERKINGEN

Tijdens de klinische studies werden milde braakklachten van voorbijgaande aard waargenomen (16% van de behandelde honden); tevens werd diarree waargenomen (12% van de behandelde honden).

Deze bijwerkingen traden in het algemeen op binnen 5 tot 7 dagen na aanvang van de behandeling en hielden in de meeste gevallen 1 tot 2 dagen aan. In enkele gevallen hielden deze bijwerkingen langer aan, bij sommige honden langer dan 7 dagen. Dit had echter geen effect op de effectiviteit van het product en daardoor was er geen noodzaak tot stoppen met de behandeling of aanpassen van de dosering. Genoemde bijwerkingen waren omkeerbaar en aan het eind van de behandeling waren de honden klachtenvrij zonder dat enige aanvullende therapie noodzakelijk was.

#### ■ DOELDIER

Hond

#### ■ DOSERING EN GEBRUIK

De dosering bedraagt 2 mg/kg lichaamsgewicht per dag, eenmaal daags en moet over de maaltijd of een deel van de maaltijd gedruppeld worden gedurende 28 dagen (dit komt overeen met 1 ml van de orale oplossing per 10 kg lichaamsgewicht per dag).

Omdat de parasiet zich ook bevindt in o.a. beenmerg, lymfeknopen, milt en lever, is het erg belangrijk dat de behandelduur van 28 dagen wordt aangehouden om verzekerd te zijn van een goede effectiviteit van het product. Daarom is het ook belangrijk dat de hond vóór en tijdens de behandeling gewogen wordt.

#### ■ BEWAARCONDITIE EN HOUDBAARHEID

Bewaren bij kamertemperatuur.

Houdbaarheid na openen flesje met oplossing: 1 maand. Niet meer gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum

#### ■ SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

*Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren*

- Het gewicht van de hond moet vóór en gedurende de behandeling nauwkeurig vastgesteld worden.
- Aanbevolen wordt het product op de voeding van de hond aan te brengen om de kans op maagdarmlaesten tot een minimum te reduceren. Mochten dergelijke klachten zich toch voordoen (bv. braken, diarree), neem dan onmiddellijk contact op met de dierenarts.
- De gelijktijdige toediening van antibraakmiddelen kan het risico van ongewenste bijwerkingen verminderen.
- Het gebruik bij honden met ernstige lever-en/of hartproblemen is ter beoordeling van de dierenarts
- Neem bij mogelijke dracht van de hond eerst contact op met uw dierenarts.

*Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het product toedient*

- Het product moet niet toegediend worden door zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen van wie niet zeker is of ze zwanger zijn.

- Mensen met een bekende overgevoeligheid voor miltefosine moeten direct contact met het product en de excreta van dieren (feces, urine, speeksel, braaksel, etc.) vermijden en moeten de nodige voorzichtigheid betrachten bij gebruik van het product.
- Het product kan oog- en huidirritatie en sensibilisatie veroorzaken: beschermende maatregelen als het dragen van handschoenen en bril zouden genomen moeten worden bij gebruik van dit product.
- Het flesje niet schudden voor gebruik om schuimen te voorkomen.
- Neem in geval van inname of contact met de huid direct contact op met de huisarts en toon de verpakking of de bijsluiter.
- In geval van oog- of huidcontact direct spoelen met veel water en contact opnemen met huisarts.
- Behandelde honden niet toestaan om mensen te likken direct na inname van het product.
- Niet eten, drinken of roken tijdens toedienen van dit product.

#### Overige voorzorgsmaatregelen

- Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
- Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenkomst met de nationale vereisten te worden verwijderd.

#### ■ INTERACTIES MET ANDERE MEDICIJNEN

Geen bekend

#### Fabrikant:

VIRBAC S.A. - 06516 Carros (France)

#### Distributeur:

VIRBAC Nederland BV – 3770 AH BARNEVELD



1. Trek de handschoenen aan.

2. Vervang het plastic kapje van het flesje voor de doorzichtige doseerdop (goed doorduwen).

3. Zet de spuit op de doseerdop. Draai de fles om en zuig de gewenste dosering op.

4. Druppel de vloeistof over de maaltijd.

5. Doe de spuit terug in de plastic houder in de doos.  
LET OP: SPIJT NIET OMSPOELEN MET WATER.



6. Trek de handschoenen uit.

7. Was daarna uw handen met water en zeep.