

Ypozane



Samenstelling

Elk tablet bevat 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg of 15 mg osateronacetaat.

Eigenschappen

Osateronacetaat is een steroïd. Het is chemisch verwant aan progesteron en heeft daardoor een krachtige progestagene en krachtige anti-androgene werking. Ook de voornaamste metabooliet van osateronacetaat (15 β -gehydroxyleerde osateronacetaat) heeft een anti-androgene werking. Via diverse mechanismen remt osateronacetaat de effecten die ontstaan door een overmatige hoeveelheid aan mannelijk hormoon (testosteron). Het voorkomt de binding van androgenen met hun receptoren in de prostaat, concurreert met androgenen en voorkomt dat testosteron de prostaat binnendringt. Er zijn geen schadelijke effecten waargenomen m.b.t. de kwaliteit van het zaad.

Doeldier

Hond

Indicaties

Ter behandeling van goedaardige prostaathyperplasie (BPH) bij reuen.

Toediening/dosering

Voor oraal gebruik. 0,25 – 0,5 mg osateronacetaat per kg lichaamsgewicht, éénmaal per dag, gedurende 7 dagen.

Gewicht van de hond	Dosis osateronacetaat per tablet	Aantal tabletten per dag	Behandelingsduur
3 tot 7,5 kg	1,875 mg	1 tablet	7 dagen
7,5 tot 15 kg	3,75 mg		
15 tot 30 kg	7,5 mg		
30 tot 60 kg	15 mg		

**Er zijn geen gegevens beschikbaar voor honden die minder dan 3 kg lichaamsgewicht wegen.*

De tabletten kunnen direct in de bek worden gegeven of met het voer worden vermengd. De maximale hoeveelheid moet niet worden overschreden.

Bijwerkingen

Tijdelijke toename van de eetlust. Een tijdelijke verandering van het gedrag, zoals een activiteitstoename of -afname, of sociaal gedrag komt veel voor. Andere negatieve reacties zoals tijdelijk braken en/of diarree, flinke dorst, lusteloosheid of groei van de melkklieren treden niet vaak op. Al deze negatieve reacties zijn omkeerbaar zonder specifieke behandeling.

Waarschuwingen

Bij honden met BPH die gepaard gaat met prostaatontsteking kan het product gelijktijdig worden toegediend met antibacteriële middelen.

Voorzorgen

Handen wassen na gebruik. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd, dienen contact met dit product te vermijden of dienen plastic wegwerphandschoenen te dragen wanneer zij het product toedienen. Ongebruikt diergeneesmiddel of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Cortisolconcentraties in het plasma kunnen tijdelijk afnemen; dit kan enkele weken na de toediening aanhouden. Bij honden met stress (b.v. na een operatie) of met hypoadrenocorticisme dient goed toezicht te worden gehouden. Het is eveneens mogelijk dat de reactie op een ACTH stimulatietest wordt onderdrukt gedurende enkele weken na gebruik. Bij honden met een leverstoornis moet behoedzaam worden opgetreden.

Bewaarcondities/Houdbaarheid

Bewaren in de originele verpakking tussen 15-25°C. Houdbaar tot 3 jaar na productiedatum.

Verpakking

Doos met blister à 7 tabletten.



Ypozane

vervolg

Registratienummer	EU/2/06/068/001-004 REG NL 101404/102167/102168/102170
Kanalisatie	UDA
Artikelnummer	90.025.30 Ypozane 1,875 mg 90.025.32 Ypozane 3,75 mg 90.025.34 Ypozane 7,5 mg 90.025.36 Ypozane 15 mg
EAN code	8714076004306 Ypozane 1,875 mg 8714076004320 Ypozane 3,75 mg 8714076004344 Ypozane 7,5 mg 8714076004368 Ypozane 15 mg