

Suramox 1000 mg/g



Samenstelling	Bevat per gram Amoxicilline trihydraat 1000 mg (equivalent aan 871.24 mg amoxicilline)
Eigenschappen	Amoxicilline is een bactericide antibioticum dat behoort tot de semi-synthetische penicilline-groep. Het dankt zijn activiteit aan de remming van de ontwikkeling van het peptidoglycaan netwerkstructuur in de bacteriële celwand. Amoxicilline is een semisynthetische penicilline met een breed werkingsspectrum tegen Gram positieve en Gram negatieve bacteriën.
Doeldier	Kip, eend en kalkoen
Indicaties	Behandeling van infecties bij kippen, kalkoenen en eenden veroorzaakt door bacteriën gevoelig voor amoxicilline.
Toediening/dosering	Oraal toedienen in het drinkwater. De volgende formule kan worden gebruikt om de benodigde hoeveelheid product per dag (in gram) te berekenen: $\frac{\text{Aantal vogels} \times \text{gemiddeld levend gewicht (kg)}}{1000/20 \text{ (voor 20 mg/kg) of } 1000/15 \text{ (voor 15 mg/kg)}}$ <u>Kippen:</u> 15 mg per kg lichaamsgewicht. De totale duur van de behandeling bedraagt 3 opeenvolgende dagen of in ernstige gevallen 5 opeenvolgende dagen. <u>Eenden:</u> 20 mg per kg lichaamsgewicht gedurende 3 opeenvolgende dagen. <u>Kalkoenen:</u> 15-20 mg per kg lichaamsgewicht gedurende 3 opeenvolgende dagen of in ernstige gevallen gedurende 5 opeenvolgende dagen. Om een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden. De opname van gemedicineerd drinkwater is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren. Om een juiste dosering te verkrijgen, dient de concentratie amoxicilline in het drinkwater dienovereenkomstig te worden aangepast. Bereid de oplossing met vers leidingwater direct voor gebruik. Gemedicineerd drinkwater dient elke 24 uur te worden vervangen. Om de consumptie van het gemedicineerde water te garanderen, moeten de dieren geen toegang hebben tot andere watervoorziening tijdens een behandeling. Het gebruik van geschikte, geijkte weegapparatuur voor het beheer van de berekende hoeveelheid van het product is aanbevolen. Oplosbaarheid in water varieert afhankelijk van de temperatuur en waterkwaliteit en van de duur en de intensiteit van het roeren. Onder de ongunstigste omstandigheden (10°C en zacht water), is de maximale oplosbaarheid ongeveer 1,0 g/L maar dit neemt toe door de temperatuur te verhogen. Bij 25°C en in hard water wordt de maximale oplosbaarheid verhoogd tot ten minste 2 g/L. Voor stockoplossing en bij het gebruik van een doseersysteem: zorg dat de maximale oplosbaarheid, die onder de gegeven omstandigheden kan worden bereikt, niet wordt overschreden. Pas de instellingen van de stroomsnelheid van de doseerpomp aan afhankelijk van de concentratie van de voorraadoplossing en van de wateropname van de behandelde dieren. Een matige stijging van de temperatuur en het voortdurend roeren kunnen helpen om de oplosbaarheid te verhogen.
Contra-indicaties	Niet gebruiken bij herkauwers, paarden, lagomorfen en knaagdieren zoals konijnen, hamsters, woestijnratten en cavia's.
Bijwerkingen	Er zijn geen bijwerkingen waargenomen na toediening van 5 maal de aanbevolen dosering. Behandeling dient symptomatisch te zijn en er is geen specifiek antidotum beschikbaar. Penicillines en cefalosporinen kunnen overgevoeligheidsreacties na toediening veroorzaken. Allergische reacties op deze stoffen kunnen in sommige gevallen ernstig zijn.
Wachttijdadvies	Kippen: (Orgaan)vlees 1 dag Eenden: (Orgaan)vlees 9 dagen Kalkoen: (Orgaan)vlees 5 dagen

Suramox 1000 mg/g

Vervolg wachttijdadvies	Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 3 weken voor het begin van de leg.
Voorzorgen	Niet gebruiken bij dieren met een overgevoeligheid voor penicillines en andere β -lactam antibiotica. Het gebruik van het product dient gebaseerd te zijn op gevoeligheidstesten en er moet rekening worden gehouden met het officiële en nationale antimicrobiële beleid. Resistentie tegen amoxicilline kan variëren, daarom moet het gebruik van het product worden gebaseerd op kweek en gevoeligheid van micro-organismen afkomstig van ziektegevallen op het bedrijf of uit recente eerdere ervaringen op het bedrijf. Onjuist gebruik van het product kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen amoxicilline verhogen en de effectiviteit hiervan verminderen. Niet effectief tegen beta-lactamase producerende organismen. Adem de stof niet in en vermijd aanraking met de huid. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker volgens Europese norm EN 140 met een filter volgens EN 143. Penicillines kunnen overgevoeligheid (allergie) veroorzaken na inademing, inslikken en huidcontact. Overgevoeligheid voor penicillines kan leiden tot kruisreacties met cefalosporinen en omgekeerd. Allergische reacties op deze stoffen kunnen, in sommige gevallen ernstig zijn. Personen met een bekende overgevoeligheid voor amoxicilline of die geadviseerd zijn om niet met dergelijke middelen te werken moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Als u symptomen, zoals huiduitslag, ontwikkelt na contact, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Zwelling van het gezicht, lippen of ogen of moeilijkheden met ademen zijn ernstigere symptomen, die onmiddellijke medische aandacht vereisen. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik van het product. Handen wassen na gebruik. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.
Waarschuwingen	Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaarcondities/ Houdbaarheid	Droog, donker en beneden de 25°C bewaren in de originele verpakking. Houdbaar tot 1,5 jaar na productiedatum. Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden. Houdbaarheid na verdunning/reconstitutie: 24 uur. Na opening, houd de zak zorgvuldig gesloten ter bescherming tegen licht en vocht.
Verpakking	Zak à 1000 g
Registratienummer	REG NL 112820
Kanalisatie	UDD
Artikelnummer	90.019.89 Bijbehorend artikel: 90.019.91 Surasol sachet 250 gram
EAN code	8714076006768