

# Deltanil pour-on



Samenstelling	Bevat per ml 10 mg deltamethrin
Eigenschappen	Deltamethrin is een synthetisch pyrethroïde met insecticide en acaricide activiteit.
Doeldier	Rund en schaap
Indicaties	<p>Een topicale behandeling en preventie van besmettingen door luizen en vliegen bij runderen; teken, luizen, schapenluisvlieg en gevestigde myasis op schapen en luizen en teken op lammeren</p> <p><u>Rund:</u> Voor de behandeling en preventie van besmettingen door zowel zuigende als bijtende luizen, inclusief <i>Bovicola bovis</i>, <i>Solenopotes capillatus</i>, <i>Linognathus vituli</i> en <i>Haematopinus eurysternus</i>. Ook als een hulp bij behandeling en preventie van infecties door zowel bijtende als overlast veroorzakende vliegen inclusief <i>Haematobia irritans</i>, <i>Stomoxys calcitrans</i>, <i>Musca</i> soorten en <i>Hydrotaea irritans</i>.</p> <p><u>Schaap:</u> Voor de behandeling en preventie van besmettingen door teken <i>Ixodes ricinus</i> en door luizen (<i>Linognathus ovillus</i>, <i>Bovicola ovis</i>), schapenluisvlieg (<i>Melophagus ovinus</i>) en myasis (gewoonlijk <i>Lucilia</i> spp).</p> <p><u>Lammeren:</u> Voor de behandeling en preventie van besmettingen door teken <i>Ixodes ricinus</i> en door luizen <i>Bovicola ovis</i>.</p>
Toediening/dosering	<p>Uitwendig.</p> <p><u>Rund:</u> 100 mg deltamethrin per dier, dit komt overeen met 10 ml.</p> <p><u>Schaap:</u> 50 mg deltamethrin per dier, dit komt overeen met 5 ml.</p> <p><u>Lammeren:</u> (onder de 10 kg lichaamsgewicht of jonger dan 1 maand) 25 mg deltamethrin per dier, dit komt overeen met 2½ ml.</p> <p>De totale dosis toedienen op het midden van de rug ter hoogte van de schouderbladen, met behulp van het doseercompartiment van de fles of met behulp van de bijbehorende handsprit. Zie de volgende specifieke aanwijzingen.</p> <p><b>Luizen:</b> Eén toediening zal in het algemeen alle luizen elimineren. Compleet verdwijnen van alle luizen kan 4-5 weken in beslag nemen, in deze periode kunnen luizen uit de eieren komen en zullen worden gedood. Op een minderheid van de dieren kunnen soms enkele luizen overleven.</p> <p><b>Vliegen:</b> Waar vooral <i>Haematobia irritans</i> vliegen zijn, kan behandeling en preventie van besmetting worden verwacht van 4-8 weken.</p> <p><b>Teken bij schapen:</b> Toediening midden tussen de schouders zal zorgen voor een behandeling en preventie van besmetting door teken die aanhechten bij dieren van alle leeftijden, gedurende maximaal 6 weken na behandeling.</p> <p><b>Schapenluisvliegen en luizen bij schapen:</b> Toediening midden op de rug tussen de schouders bij schapen (al of niet geschoren) zal zorgen voor een vermindering van het aantal gevallen van bijtende luis of schapenluisvlieg besmettingen gedurende 4-6 weken na behandeling.</p> <p><b>Myasis bij schapen:</b> Direct toedienen op de door de maden aangetaste delen zodra de vlieg wordt waargenomen. Eénmalige toediening zal zorgen dat de larven snel worden gedood. In geval van uitgebreidere laesies, is het verwijderen van de verkleurde wol aan te raden.</p> <p><b>Luizen en teken bij lammeren:</b> Toediening midden op de rug tussen de schouders zal zorgen voor behandeling en preventie van besmettingen door teken gedurende maximaal 6 weken en zal het aantal gevallen verminderen van bijtende luizen gedurende 4-6 weken na behandeling.</p>
Contra-indicaties	<p>Niet gebruiken bij zieke of herstellende dieren. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Niet toedienen op of vlakbij de ogen of slijmvliezen van het dier. Oneigenlijk gebruik van het diergeneesmiddel bij niet doeldieren zoals honden en katten, kan leiden tot neurologische vergiftigingsverschijnselen (ataxie, convulsies, tremoren), maagdarmproblemen (overmatig speekselen en braken) en kan zelfs fataal zijn. Voorkom oplikken van het diergeneesmiddel.</p>

# Deltanil pour-on

Vervolg contra-indicaties	Vermijd gebruik van het Deltanil bij extreem warm weer en zorg dat dieren toegang tot drinkwater hebben. Alleen toedienen op een intacte huid omdat intoxicatie mogelijk is door absorptie via grote huiddefecten. Desondanks kan lokale irritatie optreden na behandeling omdat de huid al is aangetast door de besmetting.
Bijwerkingen	Schilfering en jeuk zijn gezien bij sommige runderen in de 48 uur na behandeling. Enkele bijwerkingen zijn waargenomen na overdosering. Waaronder paraesthesia en irritatie, deze symptomen zijn echter mild en van voorbijgaande aard en behoeven niet behandeld te worden.
Wachttijdadvies	<u>Rund:</u> (Orgaan)vlees: 17 dagen Melk: 0 dagen <u>Schaap:</u> (Orgaan)vlees: 35 dagen Melk: 0 dagen
Waarschuwingen	Degene die het diergeneesmiddel toedient moet zich, tijdens deze handeling of bij contact met recent behandelde dieren, beschermen met beschermende kleding inclusief waterdicht schort en laarzen en ondoordringbare handschoenen. Verwijder sterk vervuilde kleding direct en was deze voordat deze hergebruikt wordt. Was spetters op de huid direct met veel water en zeep. Was handen en blootgestelde huid na gebruik van dit diergeneesmiddel en voor de maaltijd. In geval van oogcontact, grondig spoelen met water en raadpleeg een arts. In geval van accidentele ingestie, spoel de mond uit met veel water en er dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Niet roken, drinken of eten tijdens gebruik. Dit diergeneesmiddel bevat deltamethrin wat kan leiden tot tintelingen, jeuk en vlekkerige roodheid van de blootgestelde huid. Als u zich niet goed voelt na het werken met dit diergeneesmiddel, raadpleeg dan uw arts en toon de bijsluiter of het etiket. Deltamethrin is toxisch voor insecten in de mest. Het risico voor de mest-fauna kan worden verminderd door een te hoge frequentie en herhaaldelijk gebruik van deltamethrin (en andere synthetische pyrethroiden) te vermijden bij runderen, bijvoorbeeld door één enkele behandeling per jaar op de zelfde weide. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. De veiligheid van Deltanil is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Gebruik bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming met de baten/risico beoordeling van de dierenarts.
Voorzorgen	Niet gebruiken met enig ander insecticide of acaride. Vooral in combinatie met organo-fosfaten wordt de toxiciteit van deltamethrin verhoogd.
Bewaarcondities/ Houdbaarheid	Bewaren in de originele verpakking. Houdbaar tot: zie verpakking. Houdbaarheid na opening van de flacon: 1 jaar.
Verpakking	Flacon à 500 ml en 1000 ml
Registratienummer	REG NL 111025
Kanalisatie	Vrij
Artikelnummer	90.004.33 Dentanil pour-on 500 ml 90.004.34 Dentanil pour-on 1000 ml
EAN code	3597133068542 Deltanil pour-on 500 ml 3597133066142 Deltanil pour-on 1000 ml