

Prosolvin

Samenstelling	Bevat per ml 7,5 mg luprostiol
Eigenschappen	Luprostiol is een synthetisch prostaglandine F2-alfa-analoog. Het heeft een sterke luteolytische werking en een werking op de uterustonius. Bij aanwezigheid van een actief corpus luteum veroorzaakt het preparaat een snel optredende luteolyse die gevolgd wordt door follikelgroei, bront en ovulatie. De werking op de uterus is van betekenis bij fysiologische en pathologische afwijkingen van dit orgaan. Verder oefent het preparaat weinig invloed uit op de gladde musculatuur, zodat ongewenste bijwerkingen nauwelijks optreden.
Doeldier	Rund, paard en varken.
Indicaties	<u>Rund:</u> - brontregulatie/oestrussynchronisatie - behandeling van suboestrus - opwekken van abortus - partusinductie - behandeling van pyometra, chronische endometritis en gemummificeerde vrucht <u>Paard:</u> - inductie van tweede bront 20 dagen p.p. - oestrusinductie - behandeling van anoestrus - opwekken van abortus - partusinductie - behandeling van pyometra en endometritis <u>Varken:</u> - partusinductie
Toediening/dosering	Rund: 2 ml intramusculair. Paard, varken: 1 ml intramusculair. Brontregulatie bij rund: bij individuele behandeling op 5-15 dagen na de bront (dus tijdens de di-oestrus) worden de dieren tochtig en ovuleren 2-4 dagen na de injectie; zij kunnen dan geïnsemineerd worden. Voor brontsynchronisatie van meerdere dieren tweemaal behandelen met een interval van 10-12 dagen; de dieren komen dan gesynchroniseerd in oestrus. Inseminatie op 72 en 96 uren na de tweede behandeling. Brontregulatie bij merries verkrijgt men door behandeling tijdens de di-oestrus. De dieren komen dan 2-4 dagen na injectie in bront en ovuleren binnen 8-12 dagen na de behandeling. Op geleide van brontverschijnselen en rectale exploratie insemineren. Ongewenste dracht: het rund kan men behandelen vanaf 1 week na dekking tot 5 maanden dracht; abortus treedt na 2-7 dagen op. Zeugen behandelen vanaf 2 weken na dekking. Opwekken van partus: bij het rund vanaf 270 dagen, bij het paard vanaf 330 dagen (mits biest in de uier en de banden verslapt) en bij de zeug vanaf 111 dagen na dekking. Bij inductie van een abortus bij tweelingdracht en behandeling van chronische endometritis, pyometra en gemummificeerde vrucht is soms een tweede behandeling nodig na 10-12 dagen. Eventueel aanvullend anti-bacteriële therapie instellen.
Contra-indicaties	Niet toedienen aan drachtige dieren indien geen abortus gewenst is.
Bijwerkingen	Bij merries kan zweten, lichte koliek en een verhoging van de lichaamstemperatuur optreden. Deze symptomen zijn van kortdurende en voorbijgaande aard.
Wachtijadvies	Vlees: 0 dagen Melk: 0 dagen
Waarschuwingen	Vermijd intraveneuze toediening.



Prosolvin

vervolg

Voorzorgen	Vermijd contact met de huid, draag daarom handschoenen. Komt het product toch met de huid in aanraking dan direct afspoelen met water. Wanneer zwangere vrouwen of CARA patiënten met het product werken dienen ze extra voorzorgen te nemen (handschoenen, beschermende kleding).
Bewaarcondities/Houdbaarheid	Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Aangeprikte flacon: direct gebruiken, niet bewaren.
Verpakking	Flacon à 10 ml, flacon à 20 ml en doos met 10 flacons à 2 ml
Registratienummer	REG NL 1357
Kanalisaie	UDA
Artikelnummer	90.016.92 Prosolvin 10 ml 90.016.94 Prosolvin 20 ml 90.016.96 Prosolvin 10 x 2 ml

