

Amphoprim

IM

Diergeneesmiddel UDA

ANTIBIOTICUM TEGEN INFECTIES BIJ LANDBOUWHUISDIEREN EN KLEINE KNAAGDIEREN.

SAMENSTELLING

Waterige oplossing voor intramusculaire (i.m.) injectie en orale toediening.
Bevat per ml: 200 mg sulfadoxine en 40 mg trimethoprim.

EIGENSCHAPPEN

AMPHOPRIM bevat een combinatie van twee werkzame stoffen: sulfadoxine en trimethoprim. Beide stoffen grijpen op twee verschillende plaatsen blokkerend in op de biosynthese van bacteriën.
Daarbij potentiëren ze, ook in lage concentratie, elkaars werking. De combinatie werkt bactericide en het werkingspectrum is breed.

DOELDIERENRund, kalf, varken en kleine knaagdieren.

INDICATIES

- Rund en kalf:**
 - respiratoire infecties veroorzaakt door Pasteurella spp., Streptococcus spp., Haemophilus spp., Corynebacterium spp., Salmonella spp. of Fusobacterium necrophorum;
 - maag- en darminfecties veroorzaakt door Escherichia coli of Salmonella;
 - peritonitis veroorzaakt door E. coli, Corynebacterium pyogenes of anaëroben;
 - urogenitale infecties veroorzaakt door E. coli, Streptococcus, Corynebacterium pyogenes of Salmonella;
 - huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actinomyces spp. of Actinobacillus spp.;
 - mastitis veroorzaakt door Staphylococcus, Streptococcus, E. coli of Klebsiella;
 - wondinfecties veroorzaakt door Gram-positieve of Gram-negatieve bacteriën;
 - arthritis veroorzaakt door E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Streptococcus spp., Corynebacterium pyogenes;
 - gegeneraliseerde infecties veroorzaakt door E. coli sepsis, Listeria monocytogenes, Haemophilus somnus, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. of Corynebacterium pyogenes;
 - (tussenklauw) infecties veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum.
- Varken:**
 - respiratoire infecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Streptococcus spp., Haemophilus spp. of Staphylococcus spp.;
 - maag- en darminfecties veroorzaakt door E. coli of Salmonella;
 - peritonitis veroorzaakt door E. coli;
 - urogenitale infecties veroorzaakt door E. coli, Streptococcus spp., Corynebacterium suis of Erysipelothrix rhusiopathiae;
 - huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actinobacillus spp. of Fusobacterium necrophorum;
 - mastitis veroorzaakt door Streptococcus spp. of E. coli;
 - wondinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp., E. coli, Corynebacterium spp. of anaëroben;
 - arthritis veroorzaakt door Streptococcus spp., Haemophilus parasuis, Corynebacterium pyogenes of Actinobacillus suis;
 - polyserositis veroorzaakt door Streptococcus spp., Haemophilus parasuis of Staphylococcus spp.;
 - gegeneraliseerde infecties veroorzaakt door E. coli sepsis, Listeria monocytogenes, Streptococcus spp., E. coli of Salmonella spp.;
 - (tussenklauw) infecties veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum of Corynebacterium pyogenes.
- Kleine knaagdieren:**
 - primaire en secundaire infecties veroorzaakt door voor de combinatie sulfadoxine en trimethoprim gevoelige bacteriën.

CONTRA-INDICATIESGeen.

DOSERING EN TOEDIENINGSWIJZE

Rund, kalf en varken: 2,5 mg trimethoprim en 12,5 mg sulfadoxine per kg lichaamsgewicht (l.g.) per dag, gedurende 3 dagen.
Kleine knaagdieren: 4,0 mg trimethoprim en 20 mg sulfadoxine per kg l.g. per dag.

Diersoort	Dosering	Toedieningswijze
Rund	37,5 ml/600 kg l.g. per dag, gedurende 3 dagen	i.m.
Kalf	6,25 ml/100 kg l.g. per dag, gedurende 3 dagen	i.m.
Varken	3 ml/50 kg l.g. per dag, gedurende 3 dagen	i.m.
Kleine knaagdieren	0,1 ml/1 kg l.g. per dag	oraal via het drinkwater

WACHTTIJDADVIES

Diersoort	Wachttijdadvies
Rund, kalf	Slacht: 8 dagen (PVV/IKB vleeskalf: 42 dagen) Melk: 3 dagen
Varken	Slacht: 10 dagen (PVV/IKB varken: 42 dagen*)

* Alleen voor big < 25 kg of < 10 weken leeftijd en zeugen (alleen vermeerdering).

BIJWERKINGEN

- Op de injectieplaats kunnen ontstekingsreacties en necrose worden waargenomen ten gevolge van weefselirritaties.
- Anemie, leukopenie en thrombocytopenie.

WAARSCHUWINGEN

- In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Het wordt aangeraden handschoenen te dragen.
- Er bestaat kans op optredende acute sterfte, hemolyse of shock na intraveneuze toediening.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Donker bewaren bij kamertemperatuur (15-25 C)
Aangeprikte flacon: 4 weken, mits donker bewaard bij kamertemperatuur.

VERPAKKING

Doos met 10 flacons à 100 ml.

REG NL 08471 UDA
Juli 2008

Registratiehouder:
Virbac - F - 06516 Carros

Distributeur:
Virbac Nederland B.V. - NL 3771 ND Barneveld