

Virbages



Samenstelling	Bevat per ml 4 mg altrenogest.
Eigenschappen	Altrenogest werkt op een analoge wijze als het natuurlijke hormoon progesteron. Indien altrenogest oraal wordt toegediend, onderdrukt het de normale sexuele cyclus waardoor de oestrus en de ovulatie uitblijven. Indien de behandeling wordt stopgezet, komen de natuurlijke hormonen vrij en komen de dieren synchroon in oestrus.
Doeldier	Varken (cyclische gelten)
Indicaties	Oestrussynchronisatie bij cyclische gelten.
Toediening/dosering	Voor toediening over het voer. 20 mg altrenogest per dier en per dag, gedurende 18 opeenvolgende dagen, wat overeenkomt met 5 ml van het product per dag en per dier gedurende 18 opeenvolgende dagen, over het voer toegevoegd voor onmiddellijke consumptie. Het toe te dienen volume dient te worden gemeten met een geschikt doseringssysteem. Toediening: De dieren scheiden en de dosering individueel toedienen. Het product over het voer toevoegen vlak voordat het wordt gegeten. Gedeeltelijk opgegeten voer verwijderen met het overig afval en niet aan andere dieren geven. De oestrussynchronisatie dient plaats te vinden onder de supervisie van een dierenarts. De cyclische gelten dienen uiterlijk 7 dagen vóór de behandeling gescheiden te worden. De dieren niet in een ander hok plaatsen tijdens de behandeling. Erop letten dat het gemedicineerd voer volledig wordt opgegeten. De meeste behandelde gelten komen in oestrus 5 tot 6 dagen na de 18de opeenvolgende dag van de behandeling.
Contra-indicaties	- Niet gebruiken bij beren. - Niet gebruiken bij drachtige en lacterende zeugen of zeugen met een baarmoederinfectie. - Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel.
Bijwerkingen	Een te lage dosering van het product kan leiden tot de vorming van follikelcysten.
Wachtijdadvies	(Orgaan)vlees: 24 dagen.
Waarschuwingen	Geen
Voorzorgen	Zwangere vrouwen of vrouwen die mogelijk zwanger zijn, dienen dit product niet te gebruiken. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten zeer voorzichtig met het product omgaan. Personen van wie bekend is dat ze progesteron-afhankelijke tumoren of trombo embolische afwijkingen hebben of zouden kunnen hebben, mogen het product niet hanteren. Direct contact met de huid vermijden. Draag beschermende kleding (handschoenen en overall) tijdens het hanteren van het product. Poreuze handschoenen kunnen dit product doorlaten. Opname door de huid kan verder toenemen indien de huid bedekt wordt met occlusief materiaal, zoals handschoenen van latex of van rubber. Indien het product per ongeluk op de huid komt, direct wassen met water en zeep. Handen wassen na gebruik en vóór het eten. In geval van accidenteel contact met de ogen, uitspoelen met veel water. Raadpleeg een arts. Effecten van overmatige blootstelling: Herhaalde accidentele opname zou kunnen leiden tot verstoring van de menstruele cyclus, baarmoeder- of buikkrampen, toegenomen of afgenomen menstruatie, verlengde zwangerschap of hoofdpijn.
Bewaarcondities/Houdbaarheid	Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen voor bewaring. Houdbaar tot 3 jaar na productiedatum. Na opening flacon: 60 dagen.
Verpakking	Flacon à 450 ml en flacon à 900 ml



Virbagest

vervolg

Registratienummer	REG NL 104178
Kanalisatie	UDA
Artikelnummer	90.022.27 Virbagest 450 ml 90.022.29 Virbagest 900 ml 90.022.26 Virbagest pump-it doseerpomp

